

HOUD BIJ HOEVEEL DOSES U GEBRUIKT

Het bijhouden van een lijst van uw Instanyl gebruik zal u helpen te bepalen hoeveel doses u heeft gebruikt en hoeveel er nog over zijn. Omdat Instanyl verkrijgbaar is in drie dosissterkten, zijn er drie kaarten met kleurcode die ieder overeenkomen met één dosissterkte (50 microgram/dosis, 100 microgram/dosis en 200 microgram/dosis). Vóór u begint met het bijhouden van uw Instanyl gebruik, kiest u de kaart die overeenkomt met de dosis die aan u is voorgeschreven, waarna u de verpakkingsgrootte (10, 20 of 40 doses) aankruist. Zorg er steeds voor dat als u Instanyl gebruikt u of uw verzorger de informatie op de kaart invult, zoals aangegeven in het voorbeeld. Als u 5 of minder doses over heeft, neem dan spoedig contact op met uw arts.

1 Gebruik de Dosis Controle Kaart die overeenkomt met de dosissterkte die aan u is voorgeschreven (50 microgram/dosis, 100 microgram/dosis en 200 microgram/dosis).

Intranasale fentanyl SPRAY
INSTANYL
50 microgram/dosis neusspray

DOSIS CONTROLE KAART Voorgeschreven doses 10 20 40

Dosis Datum en Tijd	Herhalingsdosis (Ja of Nee en Tijd)	Doses per episode	Resterende doses
16 februari - 10:00 uur	Ja - 10:15 uur	2	38
16 februari - 14:20 uur	Nee	1	37
17 februari - 10:00 uur	Nee	1	36
17 februari - 10:00 uur	Nee	1	35
20 februari - 09:00 uur	Nee	1	34
20 februari - 13:10 uur	Nee	1	33
20 februari - 17:10 uur	Ja - 17:40 uur	2	31
22 februari - 09:10 uur	Nee	1	30
22 februari - 14:10 uur	Nee	1	29

2 Kruis in deze ruimte de verpakkingsgrootte aan die door uw arts is voorgeschreven (10, 20 of 40).

6 Om een totaaloverzicht van uw resterende doses bij te houden, trekt u steeds de doses per episode (uit kolom 3) van de resterende doses van de rij erboven (uit kolom 4) af.

4 Heeft u nog een dosis gebruikt? Vul in deze kolom Ja of Nee in en ook het tijdstip van de tweede dosis.

5 Vul in deze kolom het totaal aantal gebruikte dosissen in dat nodig was om die doorbraakpijnisepode onder controle te krijgen.

3 Vul in deze kolom de datum en tijd in waarop u Instanyl heeft gebruikt.

7 Als u 5 of minder doses over heeft, neem dan spoedig contact op met uw arts.

voorbeeld

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

HOUD BIJ HOVEEL DOSES U GEBRUIKT

Het bijhouden van een lijst van uw Instanyl gebruik zal u helpen te bepalen hoeveel doses u heeft gebruikt en hoeveel er nog over zijn. Omdat Instanyl verkrijgbaar is in drie dosissterkten, zijn er drie kaarten met kleurcode die ieder overeenkomen met één dosissterkte (50 microgram/dosis, 100 microgram/dosis en 200 microgram/dosis). Vóór u begint met het bijhouden van uw Instanyl gebruik, kiest u de kaart die overeenkomt met de dosis die aan u is voorgeschreven, waarna u de verpakkingsgrootte (10, 20 of 40 doses) aankruist. Zorg er steeds voor dat als u Instanyl gebruikt u of uw verzorger de informatie op de kaart invult, zoals aangegeven in het voorbeeld. Als u 5 of minder doses over heeft, neem dan spoedig contact op met uw arts.

1 Gebruik de Dosis Controle Kaart die overeenkomt met de dosissterkte die aan u is voorgeschreven (50 microgram/dosis, 100 microgram/dosis en 200 microgram/dosis).

2 Kruis in deze ruimte de verpakkingsgrootte aan die door uw arts is voorgeschreven (10, 20 of 40).

3 Vul in deze kolom de datum en tijd in waarop u Instanyl heeft gebruikt.

4 Heeft u nog een dosis gebruikt? Vul in deze kolom Ja of Nee in en ook het tijdstip van de tweede dosis.

5 Vul in deze kolom het totaal aantal gebruikte dosissen in dat nodig was om die doorbraakpijnepisode onder controle te krijgen.

6 Om een totaaloverzicht van uw resterende doses bij te houden, trekt u steeds de doses per episode (uit kolom 3) van de resterende doses van de rij erboven (uit kolom 4) af.

7 Als u 5 of minder doses over heeft, neem dan spoedig contact op met uw arts.

voorbeeld

Dosis Datum en Tijd	Herhalingsdosis (Ja of Nee en Tijd)	Doses per episode	Resterende doses
16 februari - 10:00 uur	Ja - 10:15 uur	2	38
16 februari - 19:20 uur	Nee	1	37
17 februari - 10:00 uur	Nee	1	36
17 februari - 10:00 uur	Nee	1	35
20 februari - 09:00 uur	Nee	1	34
20 februari - 13:10 uur	Nee	1	33
20 februari - 17:10 uur	Ja - 17:40 uur	2	31
22 februari - 09:10 uur	Nee	1	30
22 februari - 19:10 uur	Nee	1	29



HOUD BIJ HOEVEEL DOSES U GEBRUIKT

Het bijhouden van een lijst van uw Instanyl gebruik zal u helpen te bepalen hoeveel doses u heeft gebruikt en hoeveel er nog over zijn. Omdat Instanyl verkrijgbaar is in drie dosissterkten, zijn er drie kaarten met kleurcode die ieder overeenkomen met één dosissterkte (50 microgram/dosis, 100 microgram/dosis en 200 microgram/dosis). Vóór u begint met het bijhouden van uw Instanyl gebruik, kiest u de kaart die overeenkomt met de dosis die aan u is voorgeschreven, waarna u de verpakkingsgrootte (10, 20 of 40 doses) aankruist. Zorg er steeds voor dat als u Instanyl gebruikt u of uw verzorger de informatie op de kaart invult, zoals aangegeven in het voorbeeld. Als u 5 of minder doses over heeft, neem dan spoedig contact op met uw arts.

1 Gebruik de Dosis Controle Kaart die overeenkomt met de dosissterkte die aan u is voorgeschreven (50 microgram/dosis, 100 microgram/dosis en 200 microgram/dosis).

INSTANYL
Intranasale fentanyl SPRAY

200 microgram/dosis neusspray

DOSIS CONTROLE KAART Voorgeschreven doses 10 20 40

Dosis Datum en Tijd	Herhalingsdosis (Ja/Nee en Tijd)	Doses per episode	Resterende doses
16 februari - 10:00 uur	Ja - 10:15 uur	2	38
16 februari - 14:20 uur	Nee	1	37
17 februari - 10:00 uur	Nee	1	36
17 februari - 10:00 uur	Nee	1	35
20 februari - 09:00 uur	Nee	1	34
20 februari - 13:10 uur	Nee	1	33
20 februari - 17:10 uur	Ja - 17:40 uur	2	31
22 februari - 09:10 uur	Nee	1	30
22 februari - 13:10 uur	Nee	1	29

2 Kruis in deze ruimte de verpakkingsgrootte aan die door uw arts is voorgeschreven (10, 20 of 40).

6 Om een totaaloverzicht van uw resterende doses bij te houden, trekt u steeds de doses per episode (uit kolom 3) van de resterende doses van de rij erboven (uit kolom 4) af.

4 Heeft u nog een dosis gebruikt? Vul in deze kolom Ja of Nee in en ook het tijdstip van de tweede dosis.

5 Vul in deze kolom het totaal aantal gebruikte dosissen in dat nodig was om die doorbraakpijnisepode onder controle te krijgen.

3 Vul in deze kolom de datum en tijd in waarop u Instanyl heeft gebruikt.

7 Als u 5 of minder doses over heeft, neem dan spoedig contact op met uw arts.

voorbeeld

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Intranasale fentanyl SPRAY
INSTANYL

