



病人用藥說明書
福星定膜衣錠 (VOCINTI® FILM-COATED TABLET)
Vonoprazan Fumarate

您必須經過醫師的評估後，才可以使用 VOCINTI®，開始服用前，請先詳細閱讀用藥說明書。
本須知無法取代醫師對病情的診斷或治療。若您對 VOCINTI®有任何疑問，請詢問您的醫師。

- **什麼是 VOCINTI®?用途為何？**

VOCINTI®的主要作用成分為 vonoprazan，是一種鉀離子競爭型酸阻斷劑 (potassium competitive acid blocker, PCAB)，可以減少胃酸分泌。VOCINTI®可用於下列情況：

 1. 治療食道發炎(糜爛性食道炎)。
 2. 治療胃潰瘍或十二指腸潰瘍。
 3. 與其他抗生素併用，治療幽門螺旋桿菌(Helicobacter pylori)引起的感染。
- **在您使用 VOCINTI®治療之前，應該注意哪些事項？**
 1. **如果您有下列狀況，請勿服用 VOCINTI®**
 - 對 VOCINTI®的任何成分曾有過敏反應的病史
 - 正在接受含有 atazanavir sulfate 或 rilpivirine hydrochloride 成分的藥物治療
 2. **如果您有下列狀況，請務必告知處方醫師**
 - 過去病史和現在的疾病狀況，尤其是肝臟和腎臟疾病
 - 目前正在服用的其他藥物種類
 - 懷孕或哺乳
 3. **服用 VOCINTI®可能會掩蓋胃癌症狀，用藥前應由醫師確認您的疾病並非惡性腫瘤所造成**
- **在您使用VOCINTI®治療期間，應該注意哪些事項？**
 1. **VOCINTI®之嚴重肝損傷(肝毒性)**
 - 曾接獲 VOCINTI®治療期間的肝功能異常通報，包含嚴重肝損傷(肝毒性)、皮膚和眼睛發黃(黃疸)，這些不良事件的上市後通報頻率低於 1/10,000，這些症狀可能發生在 VOCINTI®治療開始後不久即發生。
 - 如果您出現噁心、嘔吐、腹痛、食慾不振、黃疸(皮膚和眼睛發黃)、肝臟腫大或肝功能異常等症狀，應立即停藥就醫，並告知醫師您正在使用 VOCINTI®，以利醫師適時進行診斷性檢查(如肝功能檢查等)及相關處置。
 2. **其他可能副作用**
 - 如同所有藥物一樣，VOCINTI®可能會引起副作用，包含皮疹、蕁麻疹、過敏反應、味覺異常、口腔炎、胃痛、腹瀉、便秘、噁心、腹部腫脹、皮膚發黃、水腫、嗜酸性白血球增多等，但不是每個人都會發生。
 - 根據研究報告指出，降低胃部酸性的藥品可能增加骨折的機會(臀部、手腕或脊椎)，特別是接受一年或更久的治療時。如果您患有骨質疏鬆或有家族病史，或是正在使用類固醇(會增加骨質疏鬆風險)，請告知您的醫師。



- 如果在 VOCINTI[®]治療期間發生腹瀉，請立即聯繫您的醫師，因為降低胃部酸性的藥品會輕微增加感染性腹瀉的發生。
- 如果出現以上任何一項副作用或其他未列於病人用藥說明書的任何副作用，請盡速告知您的醫師或藥師，以進行適當醫療處置。
- 3. 定期回診追蹤您的病況，您的醫師可能會調整您的藥品用量
 - VOCINTI[®]會使您的胃內部酸性降低，可能影響其他您正在服用的藥品，請告知醫師或藥師您所使用的其他藥品。
- 如何使用VOCINTI[®]?
 - 請依照醫師處方的劑量、頻率與使用時間服藥。
 - 治療食道發炎(糜爛性食道炎):
 - 通常成人每日一次口服一顆 20 毫克(mg)錠劑，治療通常不超過 4-8 週。
 - 您的醫師可能為您開立較長時間的 VOCINTI[®]治療，以維持病灶癒合的療效，而癒合療效之維持劑量為每日一次口服一顆 10 毫克(mg)的錠劑，如有必要，您的醫師可增加劑量至每日一次口服一顆 20 毫克(mg)的錠劑。
 - 治療胃潰瘍或十二指腸潰瘍:
 - 通常成人每日一次口服一顆 20 毫克(mg)錠劑，胃潰瘍的治療通常不超過 8 週，十二指腸潰瘍的治療通常不超過 6 週。
 - 與其他抗生素併用，治療幽門螺旋桿菌(*Helicobacter pylori*)引起的感染:
 - 通常成人每日兩次口服一顆 20 毫克(mg)錠劑，並依您的醫師或藥師指示，併用 amoxicillin 和 clarithromycin 或 metronidazole，進行 7 天的治療。
 - VOCINTI[®]的劑量取決於您的疾病情形，您的醫生可能會給您開立不同劑量的處方，並會告訴您治療的持續時間。
 - 建議您盡量在每天固定時間搭配白開水直接吞服。
 - 如果您忘記服藥，請跳過忘記服藥的劑量，並於下次預計的時間服用下次劑量即可，請**不要**同時服用兩次(倍)劑量。
 - 在服藥前，應先確定將藥錠從泡殼包裝中取出。
- 如何儲存 VOCINTI[®]?
 - 放置於原包裝內，30°C 下避光儲存。
 - 應放置於兒童無法取得的地方。
 - 請勿使用超過包裝保存期限的藥品。

藥商：台灣武田藥品工業股份有限公司
地址：台北市信義區松高路 1 號 17 樓
電話：0800-008-999